

2011-11-18

# Undersökningsformulär

H88

2011-2013

---

Probandnummer: 8 8- \_\_\_\_\_ - 8 8

Intervjuare: \_\_\_\_\_

Datum (år/månad/dag): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Namn:* \_\_\_\_\_

*Personnummer:* \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Undersökningsformulär

Bortfall markeras med 9, 99, 999, 9999

### PSF 1. Kompletterande anamnes tagen från \_\_\_\_\_

0. Ej tagit kompletterande anamnes
1. Make/sambo
2. Barn
3. Syskon
4. Vårdhem/sjukhuspersonal
5. Journalhandlingar
6. Annan
7. Kombination
- 9.

### ANTROPOMETRI

- US1** Kroppslängd (cm) \_\_\_\_\_
- US2** Underbenslängd (cm) \_\_\_\_\_
- US3** Omkrets midja/navel (cm) \_\_\_\_\_
- US4** Omkrets stuss (cm) \_\_\_\_\_
- US5** Överarmsomfång (cm) \_\_\_\_\_
- US6a** Vikt (tiondels kg) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- US6b** (egen/annan våg) (tiondels kg) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- US6c** Längd (utförande)
0. Ej utfört
  1. Stående
  2. Stående (osäkert)
  3. Liggande \_\_\_\_\_

**SITTANDE BLODTRYCK (Efter 5 minuters vila)**

**US7a** Sittande syst (mmHg) \_\_\_\_\_

**US7b** Sittande diast (mmHg) \_\_\_\_\_

**US7c** Pulsfrekvens, sittande \_\_\_\_\_

**US8. BENÖDEM** \_\_\_\_\_

1. Nej. Har inte benödem.
2. Ja, endast vrister
3. Ja, underben + vrister antytt eller måttligt
4. Ja, underben + vrister uttalat

**US9 ÄRR EFTER HÖFTOPERATION** \_\_\_\_\_

1. Nej. Har inte ärr.
2. Ja. Vänster
3. Ja. Höger
4. Ja. Bilateralt

**US10 BLODPROVER** \_\_\_\_\_

1. Ja
2. Nej (spec)

*Specificera:* \_\_\_\_\_

**US11 EKG** \_\_\_\_\_

1. Ja
2. Nej (spec)

*Specificera:* \_\_\_\_\_

## BLODTRYCK OCH PULS

<b>US7d</b>	Ankeltryck enl. Mr Os (Hö ben)	_____
<b>US7e</b>	Liggande (efter 5 min vila) syst (mmHg)	_____
<b>US7f</b>	Liggande (efter 5 min vila) diast (mmHg)	_____
<b>US7g</b>	Pulsfrekvens, liggande (efter 5 min vila)	_____
<b>US7h</b>	Stående 1 min syst (mmHg)	_____
<b>US7i</b>	Stående 1 min diast (mmHg)	_____
<b>US7j</b>	Pulsfrekvens, stående 1 min	_____
<b>US7k</b>	Stående 3 min syst (mmHg)	_____
<b>US7l</b>	Stående 3 min diast (mmHg)	_____
<b>US7m</b>	Pulsfrekvens, stående 3 min	_____

## SPIROMETRI

<b>US12h</b>	Spirometri (utförande)	
	0. Ej utfört	
	2. Utförande OK	
	3. Utförande osäkert	_____

### 1:a försöket

<b>US12a</b>	FEV 1.0 (dl/min)	_____, _____
<b>US12b</b>	FVC	_____, _____

### 2:a försöket

<b>US12c</b>	FEV 1.0 (dl/min)	_____, _____
<b>US12d</b>	FVC	_____, _____

## PEF

US12e PEF \_\_\_\_\_

US12f PEF \_\_\_\_\_

US12g PEF \_\_\_\_\_

## POX/GÅNGTEST

### Pulsoximeter före gångtest (2 min mellan de två POX-mätningarna)

US13a %SaO2 \_\_\_\_\_ US13b PULS \_\_\_\_\_

US13c %SaO2 \_\_\_\_\_ US13d PULS \_\_\_\_\_

US13jx Gångtest (20 meter, normala gångtakt) \_\_\_\_\_ sek

US13ex Gångtest (20 meter, så fort som möjligt) \_\_\_\_\_ sek

### Pulsoximeter efter gångtest (2 min mellan de två POX-mätningarna)

US13f %SaO2 \_\_\_\_\_ US13g PULS \_\_\_\_\_

US13h %SaO2 \_\_\_\_\_ US13i PULS \_\_\_\_\_

## US15 IMPEDANS \_\_\_\_\_

1. Ja
2. Nej (Spec.)

*Specificera:* \_\_\_\_\_

## SKÄRPT ROMBERG

(Armarna utefter sidorna, tandemstående, valfri fot, max 30 sek. Om foten flyttas eller kraftig svaj, avbryts testet.)

### Tid till fall:

US16a tittar \_\_\_\_\_ sek

US16b blundar \_\_\_\_\_ sek

**CHAIR STANDING** (Uppresning till stående från stol med armstöd.)

”Håll armarna i kors över bröstet när du reser dig.” (Om det inte går, tillåt uppresning på annat sätt.)

**US17a** Stolhöjd (cm)

\_\_\_\_\_

(Mottagningsstolen 45cm)

**US17b** Klarar uppresning;

\_\_\_\_\_

1. Ja
2. Nej

**US17c** Om ja;

\_\_\_\_\_

1. Med armarna i kors över bröstet
2. Med stöd av händerna på låren (Klarar inte 1)
3. Med hjälp av armstöd (Klarar inte 1 eller 2)

**HANDSTYRKA ENLIGT VIGORIMETER**

Höger hand (bäst av tre värden)

**US18a** a) Största blåsan (männen)

\_\_\_\_\_ kPa

**US18b** b) Mellanstora blåsan (kvinnor)

\_\_\_\_\_ kPa

Vänster hand (bäst av tre värden)

**US18c** a) Största blåsan (männen)

\_\_\_\_\_ kPa

**US18d** b) Mellanstora blåsan (kvinnor)

\_\_\_\_\_ kPa

## JAEGERTAVLA 1

**US19a.** (med ev egna läsglas) \_\_\_\_\_

1. Läser J III (=6 p)
2. Läser J III med ev eget förstoringsglas
3. Läser J VII (=10p)
4. Läser J VII med ev eget förstoringsglas
5. Kan ej läsa
8. Klarar J III (=6 p) med +1.0 add. o.a
- 9.

**US19b JAEGERTAVLA 2**

(med ev egna läsglas)

1. Läser 12p \_\_\_\_\_
2. Läser 10p
3. Läser 8p
4. Läser 6p
5. Läser 5p

**US19c Synhjälpmedel (vid undersökningstillfället)**

1. Ja. (Spec.) \_\_\_\_\_
2. Nej

Specifiera: \_\_\_\_\_



**STA 53. Ofrivillig motorik (global bedömning)** \_\_\_\_\_

**Skatta högsta av 54-68.**

Avser tics, tremor, choreoatetotiska rörelser, dyskinesier, dystonier eller torticollis. Typen specificeras Särhålles från ökad motorisk aktivitet, motorisk rastlöshet eller rörelsestereotypier.

- 0-1 Inga ofrivilliga rörelser
- 2-3 Tillfällig eller lätt förekomst av ofrivillig motorik, ev. provocerade av emotionellt laddade situationer
- 4-5 Riklig förekomst av uttalad ofrivillig motorik. Den ofrivilliga motoriken kan kontrolleras så att den inte interfererar med ordinära motoriska aktiviteter
- 6. Kontinuerlig förekomst av ofrivillig motorik, som allvarligt stör patientens intentionella motorik
- 9.

**Typ av motorisk störning (skattas 0-6 enligt ovan)**

**STA 54. Tics** \_\_\_\_\_

**STA 56. Choreoatetotiska rörelser** \_\_\_\_\_

**STA 57. Dyskinesier** \_\_\_\_\_  
(abnorma rörelser, rörelsesvårigheter, smärtsamma rörelser)

**STA 58. Dystonier inkl. torticollis** \_\_\_\_\_  
(onormal muskelspänning, muskelstelhet, stelhet i nacken)

**STA 59. Myoklonier** \_\_\_\_\_  
(små ep-rörelser)

**STA 60. Katatoni** \_\_\_\_\_  
(spänningstillstånd med stelhet i musklerna vid schizofreni)

**STA 61. Akinesi** \_\_\_\_\_  
(orörlighet, långsamt rörelsemönster, parkinsonism, maskansikte, kughjulsfenomen)

**STA 62. Pelvicrural flexionskontraktur** \_\_\_\_\_  
(slutstadium vid demenssjukdom, fosterställning, kontrakturer)

**STA 63. Motor impersistens** \_\_\_\_\_  
(oförmåga att hålla kvar en rörelse, t.ex att hålla tungan ute en längre tid)

**STA 64. Fokalneurologiska symtom** \_\_\_\_\_  
(ensidiga strokesymtom t.ex högersidig pares)

**STA 66. Bipyramidala symtom** \_\_\_\_\_  
(pares bägge sidor, t.ex förlamning bägge armar)

**STA 67. Motor perseveration** \_\_\_\_\_  
(oförmåga att avbryta en rörelse, ett rörelseschema)

**STA 68. Annat** \_\_\_\_\_

**STA 69. Gångstörning** \_\_\_\_\_

0. Saknas
1. Finnes lätt
2. Finnes mer uttalat

*Specificera:* \_\_\_\_\_

**STA90. Medvetandegrad** \_\_\_\_\_

1. Utan anmärkning
2. Somnolent
3. Soporös
4. Stuporös
5. Comatös
- 9.

**STA 55b. Tremor** \_\_\_\_\_

1. Nej
2. Ja, grovvågig antydd
3. Ja, grovvågig måttlig
4. Ja, grovvågig uttalad
5. Ja, finvågig
- 9.

**STA 61b. Hypokinesi** \_\_\_\_\_

1. Nej
2. Ja, antydd
3. Ja, måttlig
4. Ja, uttalad
- 9.

**STA 65b. Rigiditet** \_\_\_\_\_

1. Nej
2. Ja, antydd
3. Ja, måttlig
4. Ja, uttalad
- 9.

**STA 64b.Pareser**

---

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 11 Nej        | 2. Facialis  |
| 2. Höger      | 3. Arm       |
| 3. Vänster    | 4. Ben       |
| 4. Bilateralt | 5. 2 + 3     |
|               | 6. 2 + 4     |
|               | 7. 3 + 4     |
|               | 8. 2 + 3 + 4 |
|               | 99           |

**STA 64cx.Pareser**

---

0. Inaktuellt
1. Central eller perifer pares
- 9.

**STA64d. Grassé.**

---

- 1 Utan anmärkning
- 2 Pos. höger
- 3 Pos. vänster